No. 85
N° 2.

observation sur une operation de la taille en 2 tems.

m. poncet Bailly de gyé sur seine bourg de champagne, agé de 72 ans ressentait depuis plusieurs années les douleurs qu'occasionne la presence d'une pierre dans la vessie; les difficultées d'uriner augmenterent de plus en plus, m. herrard chirurg. du lieu fut obligé de le sonder 2 fois par jour pendant un an.

En 1769 je fus mandé auprès de ce malade que je trouvai tres foible et exténué par les douleurs. apres l'avoir sondé je reconnus la pierre. il etait tellement decidé à se faire operer que ce fut en vain que je lui fis de vives representations sur le danger evident qu'un temperament si affoibli, et un âge si avancé devait lui faire craindre. je le preparai pendant quelques jours à l'operation que je fis le 15 octobre 1769 en presence de m.rs herrard, et carteron, l'un chirurg. et l'autre medecin.

mon incision bien faite avec le litthome caché, je portai le bouton dans la vessie sans trouver la pierre que la sonde m'avait annoncée.

ARC-37 n° 15

je craignis de trop fatiguer, non
seulement le malade, mais encore de
~~trop~~ d'irriter la vessie, par des recherches
quelques fois dangereuses, en introduisant
des tenettes pour charger la pierre.
la certitude de son existence me
fit attendre 6 jours avant de la
tirer. je mis une canule dans la
playe je fis deux fois par jour
des injections dans la vessie avec de
l'eau de guimauve; le 2.^{eme} et le 3.^{eme} jour
de l'operation ne furent pas sans
fievre et sans des cuissons tres
douloureuses occasionnées par l'ecou-
lement des urines à travers la plaie.
le ventre etoit un peu tumefié.
le 5.^{eme} jour le malade se trouva
beaucoup mieux, le sixieme, en le
pansant j'introduisis le doigt avec
beaucoup de facilité dans la plaie
je sentis la pierre engagée dans
le col de la vessie je portai une
tenette, et la tirai aussitot sans
~~beaucoup de~~ peine. la suppuration
qui etoit bien etablie, et le relachement
que la cessation de l'inflammation
avait produit, sont les 2 effets
que j'attendais pour terminer mon

operation. la pierre etait d'une figure ovale, fort herissée, et grosse comme un oeuf de pigeon.

l'experience que 120 tailles que j'ai fait depuis 24 ans tant à troyes que dans toute la champagne, m'a donné, m'a fait tenir cette conduite dans 6 ou 7 cas semblables qui m'ont tres bien reussi. #

le malade delivré de sa pierre souffrait moins, l'ecoulement des urines par la plaie ~~etait~~ devenu plus supportable, ~~et~~ s'arreta enfin 20 jours apres l'extraction de la pierre. les urines reprirent leur cours par le canal de l'urethre et le malade fut parfaitement guerri en 2 mois:

je laisse à la sagacité de m. louis les refflexions qu'il doit faire sur l'utilité de cette methode dans un memoire que le public verra avec autant de plaisir qu'il l'attend avec impatience.

Bouquot fils m^tre ès arts chirurgien à l'hôtel Royal des invalides. pour M. Bouquot Membre du college de chirurgie de paris, chirurgien major des gardes du corps du Roy compagnie de beauvau; et des hopitaux de troyes.

Collot dans son traite de la taille rapporte 4 observation sur le même sujet.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

m. Sabatier à opéré à la
méthode de hawkins en 1773. un officier
invalide âgé de 45 ans,
il à fait la taille en 2 tems;
et doit avoir communiqué à
m. louis son observation.